


ข้อปฏิบัติ สำหรับการใส่ Facemask หรือ Reverse Pull Headgear

Forehead rest
(ที่วางหน้าผาก)

Chin cup
(ส่วนที่วางคาง)



Vertical Bar
(โคง Facemask)

Crossbar
(แท่นแนวนอน)

- 1 สวม Facemask วันละ 12-14 ชั่วโมง
- 2 นำ Facemask มาทุกครั้งที่พบทันตแพทย์
- 3 แผ่นรองศีรษะ/คาง และตะขอยางยืดได้ปรับให้พอดี
สำหรับคนไข้แล้ว หากใช้งานไปแล้วรู้สึกหลวมขึ้น คนไข้
สามารถปรับแรงกดเหล็กที่ยึดไว้ปรับให้แน่นขึ้นได้



- 4 สามารถใช้วัสดุนุ่มๆวางคลุมแผ่นรอง
คางได้ เช่น กระดาษทิชชู แผ่นเช็ดเครื่อง
สำอาง สำลีนุ่มๆ ถุงเท้าเด็ก บางกรณี
อาจจะต้องเปลี่ยนฟองน้ำรองคางเพราะ
อาจมีน้ำลายไหลเข้าไปในร่องคางได้
จึงต้องหมั่นทำความสะอาดเพื่อป้องกัน
การระคายเคืองของผิวหนัง

- 5 กรณีพบว่าอุปกรณ์ข้างใดข้างหนึ่งหลวมให้หยุดใช้
และติดต่อคลินิกทันที
- 6 ข้างล่างอุปกรณ์ขยายเพดาน หรืออุปกรณ์ส่วนที่อยู่
ในปากโดยกระบอกฉีดน้ำ หากซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
หรือใช้ Waterpik ในการพ่นล้างเศษอาหารออก